



Fiche de culture

Angraecum



Distribution géographique : La plupart des espèces sont endémiques de Madagascar. Les autres sont abritées par l'Est de l'Afrique tropicale, les Comores, les îles de la Réunion et Nosy bé. Nombre d'espèces découvertes actuellement : environ 200.

Végétation : Plantes monopodiales dépourvues de réserves. Diversité de dimensions, de formes, de tailles de fleurs et de types de feuillages. Plante en majorité épiphyte vivant sur les mousses des forêts humides entre 100 et 2000 m d'altitude.

Floraison : 4 à 8 semaines, en hiver ou au printemps. Point commun : la couleur des fleurs blanche, ivoire ou légèrement verdâtre mais toujours claire.

Culture : Plantes de culture moyennement facile. Déconseillé hors d'une serre pour les grandes espèces, quelques espèces possible en appartement ou maison (*A. didieri*, *A. ramosum*, *A. rutenbergianum*, *A. distichum*).

Parfum : Elles sont toutes parfumées dès la tombée de la nuit.

Eclairage : Pour les espèces à feuillage épais ressemblant aux *Vanda*, beaucoup de lumière. A l'inverse, les petits ou ceux à feuilles fines demandent moins de lumière et peuvent être cultivés en appartement.

Températures : Malgré les différents climats et altitudes où on les trouve, la plupart se cultivent en milieu tempéré : 18 à 25°C le jour et 13 à 16°C la nuit, écart j / n 5 à 8°C. Certains comme *A. disticum*, *A. germinianum*, *A. leonis*, *A. scottianum*, *A. birrimense* demandent des températures plus élevées (serre chaude) 18 à 30°C le jour et 16 à 25°C la nuit, écart j / n 2 à 5°C.

Hygrométrie : 60 à 80 % pour éviter une déshydratation rapide, il est recommandé de les vaporiser au moins une fois par jour en période de forte chaleur.

Arrosages : Eau non calcaire, réguliers toute l'année en laissant à peine le pot s'alléger entre les arrosages.

Période de repos : Pas de période de repos.

Rempotage : La plupart des *Angraecum* détestent les rempotages. Malgré cela il faut, tous les deux ans, le faire pour éviter des catastrophes, surtout pour les gros. Toujours repoter au moment où la plante développe une nouvelle couronne de racines.

Substrat : 80% d'écorce de pin et 20% de billes d'argile expansée de granulométrie adaptée selon la taille des plantes et des racines.

Engrais : Equilibrés toute l'année, mais pendant les 4 mois précédant la floraison donner un engrais riche en phosphore.

Sortie au jardin : Oui. Espèces de culture tempérée : du 1^{er} juillet au 15 août. Espèces de culture froide : du 1^{er} juin au 15 octobre lorsque les températures nocturnes sont supérieures à 10°C.

Remarques : L'eau ne doit pas stagner à la base des feuilles si vous pulvérisez le feuillage.