



Fiche de culture

Baptistonia echinata syn. *Oncidium brunleesianum*



Distribution géographique : Endémique des forêts pluvieuses de basse altitude du Sud-est du Brésil (Rio de Janeiro, Sao Paolo).

Végétation : Plante épiphyte de petite taille, pseudo-bulbes hauts de 3 à 6 cm, feuilles longues de 8 à 12 cm. L'inflorescence longue (jusqu'à 45 cm) et pendante, entourée de bractées, porte de très nombreuses petites fleurs, en forme de cloche, larges de 2 à 2,5 cm.

Floraison : Février à Avril. Durée : 1 mois environ.

Culture : Facile.

Parfum : Non.

Eclairage : Beaucoup de lumière.

Températures : Intermédiaires. 18 à 25°C le jour, 12 à 20°C la nuit, écart j/n 5 à 7°C.

Hygrométrie : 75 à 80 % d'humidité.

Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers et abondants pendant sa croissance, le support ne doit jamais sécher complètement.

Période de repos : A maintenir plus au frais et plus sec en hiver.

Rempotage : Culture en suspension ou sur plaque de liège.

Substrat : Granulométrie moyenne. 80 % d'écorce de pin et 20 % de billes d'argile expansée.

Engrais : Equilibré toute l'année. 1 arrosage sur 2 en période de végétation, 1 arrosage sur 3 lorsque les pseudo-bulbes sont développés.

Sortie au jardin : Elle apprécie un séjour à l'extérieur du printemps à l'automne, à ombre modérée et avec brumisations.



Plante du mois de la réunion
d'association du 12/05/2012

Baptistonia echinata