



Fiche de culture

Renanthera



Distribution géographique : Nord-est de l'Inde, Vietnam, Birmanie, Asie du Sud-est, Chine, Philippines, Nouvelle Guinée.

Végétation : Epiphytes dans les forêts claires ou les prairies très humides entre 100 et 1500 m d'altitude. Absence de pseudo-bulbes, tiges plus ou moins hautes. Les feuilles sont distiques, épaisses, parfois coriaces. Une quinzaine d'espèces.

Floraison : 6 à 8 semaines, principalement au printemps et en été. Les inflorescences naissent entre les feuilles et sont souvent ramifiées.

Culture : Moyennement facile, car leur culture suppose un fort taux d'hygrométrie. Quasiment impossible en appartement.

Parfum : Non

Eclairage : Demandent beaucoup de lumière mais craignent le soleil direct aux heures chaudes de la journée de mars à novembre. Une exposition au Sud est indispensable.

Températures : Chaudes pour certains, tempérées chaudes pour d'autres :

- Chaudes : 20 à 30 °C le jour et 18 à 22 °C la nuit, écart j/n de 2 à 4 °C.
- Tempérées chaudes : 18 à 27 °C le jour et 16 à 18 °C la nuit, écart j/n de 7 à 8 °C.

Hygrométrie : 80 à 85 % d'humidité avec ventilation.

Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers toute l'année en maintenant le compost légèrement humide pendant la période de végétation. En hiver, laisser le pot s'alléger entre les arrosages.

Période de repos : Non

Rempotage : Tous les 2 ans lorsque la plante produit des nouvelles racines.

Substrat : Moyenne granulométrie. 80 % d'écorce de pin et 20 % de billes d'argile expansée.

Engrais : Equilibré toute l'année à raison d'1 arrosage sur 2 au printemps et en été, et 1 sur 3 en automne et en hiver.

Sortie au jardin : La culture à l'extérieur n'est pas indispensable et n'est conseillée que dans les régions humides du 1^{er} juillet au 15 août.

Remarques : Floraisons spectaculaires.